



## GEBRAUCHSINFORMATION

### WARNUNG: DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DIE NUTZUNG DURCH KINDER, JUGENDLICHE UND NICHTRAUCHER VORGESEHEN

Bitte lesen Sie diese komplette Broschüre aufmerksam durch bevor Sie dieses Produkt benutzen. Sie beinhaltet wichtige Informationen. Bewahren Sie diese Broschüre auf; Sie möchten sie eventuell noch einmal lesen.

#### ANLEITUNG ZUM NACHFÜLLEN

Basierend auf Kanger CLTank v2. Das Gerät dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie zum Nachfüllen verwenden. Bitte beachten Sie: Die Nachfüllöffnung auf dem gewählten Gerät sollte in der Lage sein, den Flaschen-Trichter einzuführen, welcher 2,1 mm breit und 9 mm lang ist.



1) Halten Sie den Behälter mit einer Hand und nehmen Sie die andere um den oberen Verschluss herunterzudrücken und im Uhrzeigersinn zu drehen.

2. Gießen Sie in den offenen Tank Flüssigkeit, wobei darauf geachtet werden sollte, nichts zu verschütten

3. Schließen Sie den Verschluss. Geben Sie der Flüssigkeit einige Minuten, um sich in der Spirale zu verteilen und nutzen Sie dann die Wattleistung, die die Spirale anzeigt.

#### GEBRAUCHSINFORMATION

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch mit nachfüllbaren elektronischen Zigaretten gedacht, damit Sie Ihre Nikotindosis nach Ihren persönlichen Anforderungen erhalten.

Schütteln Sie das Produktgut, bevor Sie es nachfüllen. Bitte trinken Sie dieses Produkt nicht und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Haut und Augen.

#### AUFBEWAHRUNGSBESTIMMUNGEN

Bewahren Sie den Behälter fest verschlossen in einer aufrechten Position auf.

Bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur auf (zwischen 18-30 °C), vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

Bewahren Sie das Produkt NICHT im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe auf oder über 30 °C.

#### GEGENANZEIGEN

##### Aufgrund des Propylenglykols

- Unerwünschte Wirkungen können bei Patienten auftreten, die mit Disulfiram oder Metronidazol behandelt werden.
- Personen mit einer Vorgeschichte von Atopie, allergischer Rhinitis (Heuschnupfen) oder Fällen von Ekzemen in der Kindheit können anfällig für die Entwicklung allergischer Reaktionen sein.
- Wenn Propylenglykol in großen Mengen von Kindern, Schwangeren oder Patienten mit Leber- oder Nierenversagen konsumiert wird, kann eine Laktatazidose auftreten.

##### Aufgrund des Glycerins

- Die Anfälligkeit für eine Dehydrierung ist bei älteren oder bereits dehydrierten Personen erhöht.
- Vorsicht ist bei diabetischen Patienten geboten, da Glycerin, wenn es metabolisiert zu leichter Hyperglykämie und Glykorie führen kann.

#### BESONDERE RISIKOGRUPPEN

Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder, Jugendliche oder stillende Frauen bestimmt.

#### MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Neue Nutzer von elektronischen Zigaretten könnten einen trockenen Hals, trockenen Husten, leichte Schmerzen oder Irritationen des Mundraumes oder der Atemwege erfahren. Falls die Symptome schlimmer werden oder länger als 48 Stunden anhalten, suchen Sie einen Arzt auf und berichten Sie über die Vorkommnisse wie in den Informationen in "Unerwünschte Erscheinungen berichten". Mögliche Entzugserscheinungen des Nikotins: Reizbarkeit oder Aggressionen, Gefühl von Schläppheit, Angstzustände, Unruhe, Konzentrationsschwäche, erhöhter Appetit oder Gewichtszunahme, der Wunsch zu rauchen (Verlangen), Aufwachen in der Nacht oder Schlafstörungen, verringerte Herzfrequenz.

#### ABHÄNGIGKEIT

Dieses Produkt beinhaltet Nikotin, welches ein Stoff, der Stark abhängig macht ist und deshalb nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen ist. Kein weiterer Inhaltsstoff dieses Produktes ist dafür bekannt, abhängig zu machen.

#### GIFTIGKEIT

Dieses Produkt enthält Nikotin, welches giftige Effekte auslösen kann, wenn es oral aufgenommen wird, speziell durch Kleinkinder und Kinder. Bitte trinken Sie dieses Produkt NICHT. Für den Fall, dass es verschluckt wurde, nehmen Sie bitte diese Broschüre mit zu einem Arzt. Falls das Produkt in Kontakt mit der Haut kommt, spülen Sie es sofort unter kaltem, fließendem Wasser für mindestens 15 Minuten ab.

#### UNERWÜNSCHTE ERSCHEINUNGEN BERICHTEN

Sollten Sie jegliche Nebenwirkungen als Ergebnis der Nutzung dieses Produktes beobachten, helfen Sie uns indem Sie uns darüber informieren, damit wir die Sicherheit unserer Produkte verbessern können. Füllen Sie bitte ein Onlineformular aus, das auf unserer Webseite zur Verfügung steht: [www.xyfil.com/vigilance](http://www.xyfil.com/vigilance). Alternativ können Sie sich auch direkt an die MHRA durch die Yellow Card Portal melden bei:

<https://yellowcard.mhra.gov.uk/yellowcards/tobaccoreportmediator/>.

#### INFORMATIONEN ZUM HERSTELLER

Dieses Produkt wird von Xyfil Ltd. Hergestellt, ein in England und Wales registriertes Unternehmen. Registrationsnummer: 09012568

Xyfil Ltd,  
15-19 Sedgwick Street,  
Preston, United Kingdom,  
PR1 1TP.  
Tel: +44 (0) 1772 888 778  
E-mail: [info@xyfil.com](mailto:info@xyfil.com)

**Kontaktdaten:**  
**NCS Vape GmbH**  
Kabeler Str. 68  
58099 Hagen  
Deutschland  
Telefon: 02331/3406405  
E-Mail: [info@ncsvape.de](mailto:info@ncsvape.de)  
[www.ncsvape.de](http://www.ncsvape.de)